

Fortpflanzung des Haarwildes - Paarungs-, Trag- und Setzzeit, Jungenzahl, Aufzuchtdauer –

Wildart	Paarungszeit (Brunft-, Rausch-, Ranz- oder Rammelzeit)	Tragzeit in Wochen	Setzzeit (Wurfzeit)	Anzahl der Jungen	Aufzuchtdauer etwa	Bemerkungen
Wisent	August/September	39	Mai/Juni	1	6 Monate	Führungszeit des Jungtieres ca.1 Jahr
Elchwild	September	35	E. April/Mai	1-2	6 Monate	Die Jungen wiegen bei der Geburt zwischen 8 und 16kg
Rotwild	M. September/M. Oktober	34	E. Mai/A. Juni	1 (2)	6 Monate	Das Kalb wiegt bei der Geburt ca. 6-8 (10)kg
Damwild	M. Oktober / M. November	33	Juni	1 (2)	6 Monate	Das Kalb wird ca. 4 Monate gesäugt
Sikawild	M. Oktober / M. November	30	Juni / Juli	1 (2)	4 Monate	Das Kalb wird 3-4 Monate gesäugt
Rehwild	M. Juli / M. August	40 (mit Vortragezeit bis Dezember)	Mai / Juni	1 – 2 (3)	6 Monate	Das Kitz wiegt bei der Geburt ca. 1kg und wird etwa 3 ½ Monate gesäugt
Gamswild	A. November / M. Dezember	24 – 26	Mai / Juni	1 (2)	6 Monate	Das Kitz wiegt bei der Geburt ca. 2,5kg
Steinwild	E. November / Januar	22 – 24	Juni	1 (2)	6 Monate	Die Jungen bilden mit ca. 4 Wochen eigene Gruppen
Muffelwild	M. Oktober / E. November	21 – 22	E. April / M. Mai	1 (2)	6 Monate	Gewicht bei der Geburt ca. 3kg
Schwarzwild	A. November / E. Januar	16 – 17	überwiegend März/April bis Mai, aber auch zu anderen Jahreszeiten	3-5 (bei jung. Bachen) 7-8 (bei älter. Bachen)	4 Monate	selten 2 Würfe im Jahr; die Jungen (Frischlinge) bleiben ca. 1 Woche im Wurfkessel
Feldhase	Januar bis August, Höhepunkt im April / Mai	6	1.Satz im März, weitere Sätze im Sommer bis A. Oktober	2 – 4 pro Satz 3 (4) Sätze im Jahr	5 Wochen	Die Jungen sind Nestflüchter
Schneehase	Februar bis Juni	6 ½ - 7 ½	April / Mai und Juli/Aug.	2 – 4 pro Satz 2 Sätze im Jahr	3 Wochen	Die Jungen sind Nestflüchter
Wildkaninchen	A. März bis August	4 – 4 ½	E. März bis September	5 – 8 pro Satz 4 – 6 Sätze im Jahr	4 Wochen	Die Jungen sind etwa 9 Tage blind
Murmeltier	E. April / A. Mai	5	Juni/Juli	2 – 4 (5)	2 Monate	Die Jungen sind bei der Geburt 30g schwer und ca. 22 Tage blind
Wildkatze	Februar / März	9	April/Mai	3 – 6	3 Monate	Die Jungen sind 9-11 Tage blind und mit 10 Monaten geschlechtsreif
Fuchs	E. Dezember / Februar	7 ½	März / April	3 – 6 (1-13)	3 Monate	Die Jungen sind 12 – 14 Tage blind
Luchs	März	10	Mai / Juni	2 – 3	12 Monate	Die Jungen sind etwa 8-15 Tage blind
Stein- u. Baummarder	Juli / August	37 (davon etwa 29 bis 30 Wochen Vortragezeit)	März / A. April	3 – 4	3 Monate	Die Jungen sind bei der Geburt ca. 30g schwer und etwa 35 Tage blind
Iltis	März (bis Juni)	6	April / Mai	4 – 8	3 Monate	Die Jungen sind bei der Geburt 10 g schwer und etwa 28 – 34 Tage blind
Hermelin (Großes Wiesel)	Februar (bis Juni/Juli)	36 – 52	März / April	4 – 6	2 Monate	Die Jungen sind bei der Geburt etwa 3g schwer und ca. 37 – 45 Tage blind
Mauswiesel (kleines Wiesel)	Februar / März (vermutlich Frühjahr bis Herbst)	5	zu allen Jahreszeiten möglich	4 – 7 (8)	ca. 2 Monate	Die Jungen sind bei der Geburt ca. 1g schwer und etwa 24-30 Tage blind
Dachs	Februar / März bzw. Juli / August	33 – 34 (davon etwa 25 bis 26 Vortragezeit)	E. Februar / A. März	2 – 3 (1-5)	5 – 6 Monate	Die Jungen sind etwa 28 – 35 Tage blind
Fischotter	Februar / März aber auch zu anderen Jahreszeiten	9	überwiegend im April, aber auch zu anderen Jahreszeiten	2 – 3 (5)	4 Monate	Die Jungen sind mindestens 10 Tage blind
Nerz	E. Februar / E. März	5 (bis 10) vermutlich Vortragezeit	April / Mai	4 – 5	3 Monate	Die Jungen sind etwa 32 – 35 Tage blind
Wolf	M. Dezember bis M. März	9	April / Mai	4 – 6	12 Monate	Die Jungen sind etwa 8 – 12 Tage blind und werden ca. 6 Wochen gesäugt
Braunbär	April bis Juli	26 – 40 (davon 4 bis 8 Wochen Vortragezeit)	Dezember / Februar	1 – 2 (3)	über 12 Monate	Die Jungen sind bei der Geburt nackt und blind und öffnen nach ca. 28 Tagen die Augen (Seher)
Marderhund (Enok)	Januar / Februar	ca. 9	April / Mai	5 – 8	3 – 4 Monate	Die Jungen sind ca. 10 Tage blind
Waschbär	Januar / Februar (März)	9	April / Mai (bis Oktober)	2 – 8	ca. 5 Monate	Die Jungen öffnen nach 13 Tagen die Ohren (Gehöre) und nach ca. 21 Tagen die Augen
Biber	Februar / März	10 – 14	Mai / Juni	2 – 3 (4)	ca. 2 Monate	Die Jungen kommen sehend zur Welt
Biberratte (Sumpfbiber, Nutria)	Januar bis Dezember	ca. 19	2 – 3 Würfe im Jahr, hauptsächlich im April u. Juli	4 – 6 (12)	ca. 2 Monate	Die Jungen kommen sehend und behaart zur Welt